

MINISTERE DE LA DEFENSE
DIRECTION DE LA SANTE MILITAIRE
RSMII - SSMII
CENTRE MEDICAL DE LA GENDARMERIE



CARNET DE SANTE

CENTRE MEDICAL DE CAMP MBOPPI

Nom et prénoms : MANGA MARGUERITE

Date de naissance : 62 ans Tél 694 43 2611

Adresse : Profession : Menagere

En cas d'accident, prévenir : Mr Bi Kim

Adresse : Cité des palmiers Tél : 699 61 9209

GS/RH : Alergie

«Tu es ce que tu as de plus cher au monde, sache prendre soin de toi»

18-10-2021

poids 55 Kgs

TA BD 173/106 mmHg

TA BD 165/102

Ti BD 77 puls/min

Ti BD 73 puls/min

T° 37°C

M/C

- Fatigue
- Fièvre
- Douleur aux articulations
- Constipation $\pm$
- Etat psychique altéré

AM : RAS

ATCD

- Médicaux : HTA connu depuis des années sans traitement. Sepano (AS)
→ le papa aussi était HTA
- Chirurgicaux : Chirurgie abdominale mais ne s'en rappelle plus
- Allergiques : $\emptyset$
- Toxicologiques : ND
- Gynécologiques : ND

E/S : - Asthénie intense.
- Polyarthralgie
- Fièvre
- Vomissements.
- Constipation.
- Dysurie
- Douleur abdom.
- Anorexie.
- Amaigrissement.

E/P : Glasgow 14/15 - Réponse verbale confus
État général altéré par l'asthénie,
l'anorexie et l'amaigrissement.

- Eruption cutanée localisée sur les bras à type de papules.
- Pli cutané persistant

CCE : AP sur patiente HTA avec déshydratation stade 2

CAT : * Nécessité d'une C/S psychologique car état psychique altéré.

① Mise en observation

② Ringer 500cc
+ Vit Bco
+ Potassium } A faire passer en 2 heures

- 1 amp IVBL d'Analgin
- 1 amp IVBL Spasfon
- 1 amp IVBL Cimetidine.

③ Antihypertenseur inj.
Loxen inj. 1 amp IV L


④ Contrôler les chiffres tensionnels toutes les 45 min à 1h après l'injection.

⑤ A la fin du Ringer mettre un glucose 5% à faire passer en 4 heures de temps.

⑥ TDR

⑦ Surveillance des paramètres vitaux toutes les 2 heures.




Che. NIEKOU Charlene
Médecin
Chef Centre Médical GE2

19h50

RL 500cc

+ vit Bco

+ potassium

+ 1A Analgin


+ 1A Spasfon

+ 1A Cimetidine

passer en

2h

1 VOL


+ Furo

IDR+

CAI

protocole Antesunate being soit

14cc 1VOL H₀, H₁₂, H₂₄ puis relais


H₀

20h30 Arins fort

- Antesunate 14cc 1VOL

ROV à 8h30

- Loxen 10mg inf 1Amp 1VOL


+ Furo

21h30

TA BD { 146/93 mmHg
TI BD { 84 puls/min

TA BG { 158/90 mmHg
TI BG { 83 puls/min

22h30

SG 5% passer en 4h

TA BD { 171/104 mmHg
TI BD { 85 puls/min

TA BG { 153/96
TI BG { 77 puls/min

T: 37,2°C

23h30

TA BD { 118/72 mmHg
TI BD { 69 puls/min

TA BG { 113/73
TI BG { 76 puls/min

00h30

TA BD { 130/80
TI BD { 76 puls/min

TA BG { 118/74
TI BG { 79 puls/min

01h20

TA BD { 129/78 mmHg
TI BD { 74 puls/min

TA BG { 115/73 mmHg
TI BG { 74 puls/min

2h30

TA BD { 127/78 mmHg
TI BD { 73 puls/min
T°: 37°C

TA BG { 111/71 mmHg
TI BG { 72 puls/min

3h30

TA BG { 149 mmHg
TI BG { 72 puls/min

TA BD { 155/97 mmHg
TI { 71 puls/min

6h

TA BD { 155/103 mmHg
TI BD { 76 puls/min
T° 36,8°C

TA BG { 151/101 mmHg
TI BG { 79 puls/min

Plaintes: R.A.S

H₁₂

8h Soins

Anté-gastrite 14 cc 1vdl 20v - 20h pour H₁₂

TA BG { 164/105
TI BG { 70

TA { 140/88 mmHg
TI { 76 puls/min

9 OCT 2021

Patiente ré-évaluée ce jour.

- FUSO

- Etat général conservé.
- regression significative de la fatigue.
- regression des chiffres tensionnels
- persistance de l'état psychologique assez obnubilé.

CAT : ① Sortie autorisée ce jour sur demande de la famille pour MPEC.

② C/S Cardiologue + Psychologue recommandé.

③ Dernière dose Traitement palustre d'aujourd'hui à 20H puis relai oral sous Coartem 80/480
1cp x 2 /jr pdt 3 jrs.
avec effort de 8h entre le 1^{er} et le 3^e cp.



Cec NIEKOU Charlene
Médecin
Chef Centre Médical OB7

21/11/21 Home visit

Seen pt - d the issue was understood. Family issues, child/parent issue.

Personal issues - all this needs to be discussed in individual sessions.

Weekly sessions to address

RDV. 25/11/21.

15³⁰ / 16.00 PM

28/11/21

Home visit.

1. Admits much improvement
Satisfactory sleep and appetite
HA OK congruent

↓ Hallucinations

Although observed talking to self especially when sitting at

metol incoherence on speech
poor memory / Attention.

short term memory.

disorientation to time.

~~occurs~~ Very much engaged
in hols.

imp Fav prog.

~~As~~ Psychotic illness

plan ① Psychoeducation.

② Risperidone 2mg
11/15 QHS #100

~~1/15/22~~ Jan 2022

Tekear Herman
M/11 Nurse
~~gt~~

12/01/2022

Not seen caregiver coming for
refill admit improvement with
all new complain. Case of Psychosis
on RSC

Pres. PSYCHOSIS
Plan.

TO continue with abuse
dispendium 1 day after 10
minutes

RisperdalConsta® L.P. 25 mg/2 ml
rispéridone

Poudre et solvant pour suspension injectable
à libération prolongée en seringue pré-remplie

 Conserver la boîte entière au réfrigérateur (entre 2°C et 8°C)

janssen 

RisperdalConsta® L.P. 25 mg/2 ml
rispéridone

Poudre et solvant pour suspension injectable
à libération prolongée en seringue pré-remplie

 Conserver la boîte entière au réfrigérateur (entre 2°C et 8°C)

janssen 

RisperdalConsta® L.P. 25 mg/2 ml
rispéridone

Poudre et solvant pour suspension injectable
à libération prolongée en seringue pré-remplie

 Conserver la boîte entière au réfrigérateur (entre 2°C et 8°C)

janssen 